

OVERLAP SINDROM: PRIMARNA BILIJARNA CIROZA, AUTOIMUNSKI HEPATITIS I SEKUNDARNI SJÖGRENNOV SINDROM - PRIKAZ JEDNOG BOLESNIKA

Živa Živić¹, Nataša Zdravković¹, Radojica Stolić², Jelena Zdravković¹, Goran Davidović¹, Vesna Grbović³

¹Interna klinika, Klinički centar "Kragujevac"

²Medicinski fakultet Priština/Kosovska Mitrovica

³Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar "Kragujevac"

SAŽETAK

Grupa autoimunskih overlap (preklapajućih) sindroma, obuhvata sindrome kod kojih se nalaze obeležja najmanje dve bolesti kao što su: primarna bilijarna ciroza i autoimunski hepatitis, primarna bilijarna ciroza i primarni sklerozirajući holangitis, primarna bilijarna ciroza i sarkoidoza, autoimunski hronični hepatitis i primarni sklerozirajući holangitis. Da bi se oboljenje jetre svrstalo u ovu grupu, potrebno je da se zadovolje serološki i morfološki kriterijumi za dijagnostiku preklapajućih bolesti.

U radu je prikazan klinički tok bolesti kod bolesnice sa primarnom bilijarnom cirozom, uz preklapanje sa autoimunskim hepatitisom i sekundarnim Sjögrenovim sindromom, uz oskudnu kliničku simptomatologiju. Karakteristike ove bolesti su znaci insuficijencije jetre sa holestatskim sindromom, poremećajem u krvnoj slici, suvoćom očiju i usta. Bolest je potvrđena serološkim testovima: pozitivnim vrednostima antimitohodrijalnih antitela u klinički značajnom titru, hipergamaglobulinemijom i patohistološkim pregledom uzorka tkiva jetre dobijenog biopsijom, gde su promene išle u prilog preklapanja između primarne bilijarne ciroze i autoimunskog hepatitisa, uz pozitivan test na suvo oko.

Ključne reči: Overlap, Primarna bilijarna ciroza, Autoimunski hepatitis, Sjögrenov sindrom.