

LICHEN PLANOPILARIS - PRIKAZ SLUČAJA

Vesna Miličić¹, Ana Ravić-Nikolić¹, Bojana Jovović-Dagović¹, Slobodanka Mitrović², Gordana Ristić¹, Nebojša Krstić¹

¹Centar za dermatovenerologiju, Klinički centar Kragujevac

²Služba za patologiju, Klinički centar Kragujevac

SAŽETAK

Lichen planopilaris (LPP) je posebna forma lichen planus-a (LP) lokalizovanog na područjima kože obraslim dlakom, pre svega, u kapilicijumu, koja može da izazove ireverzibilnu cikatrijalnu, tj. ožiljnu alopeciju. Prikazujemo muškaraca od 57 godina, koji je hospitalizovan u Centru za dermatovenerologiju sa promenama u kapilicijumu i na koži trupa i ekstremiteta. Kliničkim pregledom utvrđene su folikularne papule, pojedinačne i grupisane u plakove na frontoparijetalnom delu kapilicijuma, a na koži trupa i ekstenzornih strana ekstremiteta zaravnjene eritemolividne lihenoidne papule, neke od njih folikularnog izgleda i manji plakovi. Rutinske laboratorijske analize bile su u granicama referentnih vrednosti. Ultrazvučni pregled abdomena i RTG pluća bio je uredan. Histopatološkom analizom isečka kože sa kapilicijuma potvrđena je dijagnoza LPP, a sa ekstenzorne strane desne nadlaktice dijagnoza LP. Pacijent je lečen sistemskim i lokalnim kortikosteroidima i antihistaminikom peroralno. Posle primenjene terapije promene na koži su regresirale ostavljajući za sobom postinflamatornu hiperpigmentaciju, dok su promene u kapilicijumu bile znatno manje infiltrovane. Prikazujemo ovaj klinički slučaj jer je LPP retka inflamatorna dermatoza.

Ključne reči: bolesti kože, papuloskvamozne; lichen planus; alopecija; ožiljak; terapija lekovima.