

PRIMARNI MALIGNI MELANOM JEDNJAKA - PRIKAZ JEDNOG BOLESNIKA

Nataša Zdravković¹, Živa Živić¹, Vesna Grbović-Marković², Radojica Stolić³

¹Interna klinika, Klinički centar Kragujevac

²Centar za fizičku medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Kragujevac

³Medicinski fakultet Priština/Kosovska Mitrovica

SAŽETAK

Primarni gastrointestinalni maligni melanom je retkost. Za razliku od njega metastatski melanom u gastrointestinalnom traktu se pri gornjoj endoskopiji dijagnostikuje u 1- 4% bolesnika s primarnim kožnim, a čak u 60% takvih bolesnika na obdukciji. Tumor je lokalizovan u nazofarinksu 32,8%, analnom kanalu 31,4%, rektumu 22,2%, jednjaku 5,9%, želucu 2,7%, tankom crevu 2,3%, žučnoj kesi 1,3% i debelom crevu 0,9%. Melanomi u sluznicama su znatno agresivniji i imaju lošiju prognozu od kutanih formi zbog većeg rizika limfogenog i vaskularnog širenja bolesti, preko gastrointestinalne sluznice. Primarni maligni melanom jednjaka je retka neoplazma jednjaka. Čini 0,1% svih primarnih ezoagealnih tumora.

U našem slučaju dali smo prikaz primarnog ezoagealnog malignog melanoma kod šezdesetogodišnje bolesnice, lokalizovanog u donjim partijama jednjaka. Histološke i imunohistohemijske analize dokazale su da je radi o primarnom malignom melanomu jednjaka. Detaljno kliničko i laboratorijsko ispitivanje isključilo je postojanje malignog melanoma bilo koje druge lokalizacije.

Ključne reči: ezoagus; neoplazme ezoagusa; melanom; dijagnostičke tehnike i procedure; hirurške procedure, operativne.