

STILOVA BOLEST ODRASLIH KAO UZROK NEJASNOG FEBRILNOG STANJA

Jelena Đoković-Jovanović, Zorana Đorđević
Klinika za infektivne bolesti, Klinički centar Kragujevac

SAŽETAK

Stilova bolest kod odraslih je varijanta juvenilnog reumatoidnog artritisa. Najčešće se javlja kod osoba između 16. i 36. godine života. U radu je prikazana bolesnica, 23 godine, koja je hospitalizovana na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac, zbog povišene temperature (do 40°C), praćene bolovima u predelu zglobova šaka i ramenog pojasa koji su se pojačavali pri pokretu i pojave ospe. Ambulantno je pregledao i lečio reumatolog. S obzirom na to da su navedene tegobe i dalje perzistirale, bolesnica je hospitalizovana radi daljeg ispitivanja. Ubrzo se kod bolesnice razvila limfadenopatija, splenomegalija i ospe na prednjim stranama gornjih i donjih ekstremiteta, naročito na podlakticama i u predelu dekoltea, makulopapuloznog tipa sa slivenim eritematoznim poljima (po tipu aktivne hiperemije), veličine do 2 cm. Dijagnoza je postavljena na osnovu kliničke slike, laboratorijskih analiza, kao i dijagnostičkih kriterijuma za Stilovu bolest. U terapiji su primenjeni nesteroidni antiinflamacijski lekovi, a posle četiri dana od primenjene terapije, bolesnica je postala afebrilna i bez subjektivnih tegoba. Laboratorijski parametri su nakon dve nedelje od početka lečenja ukazivali na postepenu regresiju bolesti.

Ključne reči: *Stilova bolest, odrasli, groznica, egzantem, splenomegalija.*