

ГЛАВОБОЉА КОД ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СЕ ПОДВРГАВАЈУ ОПШТОЈ АНЕСТЕЗИЈИ

Валентина Д. Опанчина¹, Марија Живковић Радојевић¹, Слободан М. Јанковић¹

¹Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац

САЖЕТАК

Циљ. Постоперативна главобоља може бити једна од компликација које се јављају након буђења пацијента из опште анестезије. Циљ ове студије је да се испита учесталост постоперативних главобоља након опште анестезије у нашим условима.

Методе. Студија је дизајнирана као компаративна, отворена, нерандомизована клиничка студија у условима рутинске клиничке праксе. Спроведена је на одељењима торакалне, абдоминалне, васкуларне и ортопедске хирургије и гинекологије Клиничког центра у Крагујевцу. Укључени су пацијенти који су потписали писмени пристанак пре извођења студије и који су од 1. марта 2016. до 1. априла 2016. године на овим одељењима оперисани и подвргнути општој анестезији.

Резултати. Резултати ове студије показали су учесталост постоперативних главобоља након опште анестезије од 9%. Испитаници су интензитет ове главобоље, оценили на визуелно-аналогној скали. Средња вредност ове скале свих учесника студије износи $0,33 \pm 1,3$. Установљено је да је конзумирање алкохола значајан фактор за настапак постоперативних главобоља након опште анестезије ($p = 0,035$).

Закључак. Испитивање учесталости постоперативних главобоља након опште анестезије значајно је како за пацијенте, тако и за лекаре, јер се тиме ставља акценат на главобољу као постоперативну компликацију. Зато је неопходно обратити пажњу на ову врсту главобоље и утицати на смањење њене учесталости и повећање квалитета живота пацијената након буђења из опште анестезије.

Кључне речи: главобоља; постоперативни период; анестезија, општа.