

МИЛИЈАРНА ТУБЕРКУЛОЗА КОМПЛИКОВАНА СТАФИЛОКОКНОМ СЕПСОМ

Драган Станојевић¹, Гордана Антонијевић², Радиша Војиновић^{3,4}, Валентина Опанчина^{3,4}

¹Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, Сокобања

²Специјална болница за плућне болести „Озрен“, Сокобања

³Факултет медицинских наука, Катедра за радиологију, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац

⁴Клинички центар Крагујевац, Служба за радиолошку дијагностику, Крагујевац

САЖЕТАК

Милијарна туберкулоза је потенцијално фатална због масивне дисеминације *Mycobacterium tuberculosis*. Пошто су имунорегулаторни механизми поремећени, током еволуције милијарне туберкулозе развијају се неспецифичне инфекције, а понекад чак и сепса. Сепса је ретка компликација код имунокомпетентног пацијента. Код пацијената с дисеминованом туберкулозом треба обратити пажњу и спровести посебну негу ако клиничка презентација указује на сепсу. У овом раду представљамо пацијента код кога смо у исто време доказали постојање милијарне туберкулозе и стафилококне сепсе на пријему 2007. године. Прво смо дијагностиковали милијарну туберкулозу хистопатолошки путем трансбронхијалне биопсије, а након тога потврдили микробиолошким и офталмолошким прегледом. Два крвна узорка за хемокултуру са различитих локација пункција изоловале су *Staphylococcus epidermidis*. Одмах након пријема, медицински тим је започео лечење септичког шока и респираторне инсуфицијенције применом оксигенотерапије, парентералне рехидрације, вазоактивних агенаса уз одабрану комбинацију антибиотика и антитуберкулотика. Третман се наставио у екстензивној фази коришћењем комбинације антитуберкулотика и пацијент је отпуштен да се лечи код куће и долази на контроле у антитуберкулозну амбуланту.

Кључне речи: туберкулоза, милијарна; сепса; *Staphylococcus epidermidis*.