

## UZROCI AKUTNOG ABDOMINALNOG BOLA KOD PACIJENATA UPUĆENIH NA BOLNIČKO LEČENJE

*Seyed Mostafa Shiryazdi, Azadeh Azhdari, Hossein Fallahzadeh  
Odeljenje hirurgije, Univerzitet Medicine Shahid Sadoughi, Jazd, Iran*

### **SAŽETAK**

*Cilj. Akutni bol u trbuhu je najčešći uzrok posete službi hitne medicinske pomoći. Može biti uzrokovan mnogobrojnim hirurškim i nehirurškim stanjima. Ovim pacijentima je potrebna brza procena stanja zbog mogućeg operativnog lečenja. Cilj ove studije bio je proceniti učestalost i uzroke akutnog bola u trbuhu i odnos prema starosnoj dobi, osnovnoj bolesti i polu.*

*Metode. Ova studija preseka je sprovedena je na 352 pacijenta sa akutnim bolovima u trbuhu u bolnici Shahid Sadoughi. Podaci su dobijeni iz medicinske dokumentacije. Dijagnozu bolesti je postavljao lekar.*

*Rezultati. Najčešća osnovna bolest kod pacijenata sa akutnim bolom u trbuhu bila je hipertenzija (14,8%) i dijabetes melitus (10,8%). Najčešći uzroci bola u trbuhu su bili: bez ikakvog uzroka (32,2%), crevna opstrukcija (14,8%), upala slepog creva (13,1%), holecistitis (11,1%) i trovanje olovom (4%). Najčešći simptomi kod ovih bolesnika bili su mučnina (49,7%), povraćanje (48,6%), uporni bol (61,6%) i smanjen apetit (49,7%). Postojala je značajna razlika između raspodele uzroka akutnih bolova u trbuhu u pogledu starosti, pola, posla i bračnog statusa ( $p < 0,05$ ).*

*Zaključak. Najčešći uzrok akutnog bola u trbuhu bio je povezan sa crevnom opstrukcijom, upala slijepog crijeva i holecistitisom. Prevalencija upala slepog creva i crevne opstrukcije bila je veća kod mlađih pacijenata. Štaviše, holecistitis i crevna opstrukcija češći su kod žena i muškaraca. Čini se da neki parametri, uključujući starost, pol, posao i bračni status mogu biti ključni faktori koji utiču na akutni bol u trbuhu.*

**Ključne reči:** akutni bol; abdominalni bol; bolnice.