

## АНКСИОЗНОСТ КОД ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Марија Лазаревић  
Дом здравља „Др Миленко Марин“, Лозница

### САЖЕТАК

*Циљ.* У време пандемије уобичајена је појава анксиозности код особа које су изложене директном контакту с оболелима или постоји могућност таквог контакта. Циљ студије био је да утврди степен анксиозности код медицинских радника запослених на територији града Лознице и приградских општина у време пандемије COVID-19.

*Методe.* Код 120 здравствених радника анксиозност у време пандемије процењена је на основу вредности Бековог инвентара за процену анксиозности, који је у електронској форми послат свим испитаницима у данима епидемијског пораста и достизања врхунца у броју заражених вирусом COVID-19.

*Резултати.* Анализом резултата добијена је средња вредност Бековог теста за процену страха и анксиозности 6,82 (стандардна девијација 7,49, ранг 0–39) што представља стање анксиозности без клиничког значаја. Није било статистички значајних разлика у средњим вредностима Бековог инвентара анксиозности између студијских подгрупа на основу категорија пола ( $p = 0,32$ ), старости ( $p = 0,96$ ) и образовања испитаника ( $p = 0,06$ ).

*Закључак.* У раду је приказано емоционално реаговање здравствених радника на територији града Лознице и приградских општина у време пандемије COVID-19. Утврђено је да анксиозно реаговање није присутно у значајној форми и приказане су најчешће психосоматске реакције које су се јавиле на врхунцу пандемије.

**Кључне речи:** страх; анксиозност; скала за тестирање анксиозности; медицинско особље.