

HOLEDOHODUODENALNE FISTULE ULKUSNE ETIOLOGIJE: PRIKAZ DVA SLUČAJA

Dragan ČANOVIĆ¹, Branko STANKOVIĆ², Slaviša STAMENKOVIĆ², Bojan MILOŠEVIĆ²

¹ Hirurška klinika, Klinički centar, Kragujevac; Medicinski fakultet u Kragujevcu

² Hirurška klinika, Klinički centar, Kragujevac

SAŽETAK

Spontane holedohoduodenalne fistule su veoma retke. Najčešće se formiraju tokom dugotrajne evolucije ulkusne bolesti duodenuma, redje su komplikacija kalkuloze žučnih vodova, dok su drugi uzroci retki. Tokom poslednje 22 godine u našoj ustanovi su opservirana i operativno lečena 2 bolesnika sa holedohoduodenalnom fistulom ulkusne etiologije. U oba bolesnika prisutna je duga istorija ulkusne bolesti duodenuma, a dijagnoza je postavljena na rutinskim kontrolnim radiološkim pregledima želuca i duodenuma barijumskim kontrastom. Bolesnici su lečeni operativno u simptomatskoj fazi. Oba bolesnika su pored simptomologije osnovne ulkusne bolesti imali i epizode holangitisa. Oba bolesnika su operativno lečena isključnom resekcijom želuca po metodi Billroth II, tj. bez operativnog rešavanja holedohoduodenalne fistule, a kod jednog bolesnika je uradjena i holecistelctomija zbog holelitijaze. U oba slučaja uradjena je peroperativna holangiografija i konstatovana je uredna prohodnost distalnog holedoha i holedohoduodenalnog spoja. Postoperativni tok je kod oba bolesnika protekao bez komplikacija. Bolesnici se prate 7 i 9 godina i u ovom periodu nije bilo tegoba koje bi moglo da se odnose na taktička rešenja operativnog lečenja.

Ključne reči: Holedohoduodenalna fistula, ulkus, Billroth II