

NEUROPSIHOLOŠKI PROFILI DEMENCIJE SA LEWY-JEVIM TELIMA I ALZHEIMEROVE BOLESTI

Gordana Zlatić¹, Gordana Očić², Gordana Tončev¹, Gordana Tomić², Zorica Knežević¹

¹Centar za Neurologiju, Klinički centar Kragujevac, Kragujevac

²Institut za Neurologiju Klinički centar Srbije, Beograd

SAŽETAK

Neuropsihološko testiranje može da pruži validne pokazatelje u diferencijalnoj dijagnozi demencije sa Lewy-jevim telima i Alzheimerove bolesti. U osnovi neuropsiholoških deficita nalaze se specifične, ali i identične patohistološke i neurohemijske promene. U istraživanje je uključeno 23 dementna pacijenta (8 sa demencijom sa Lewy-jevim telima i 15 sa Alzheimerovom bolešću). Kognitivni deficiti kod obe bolesti su upoređivane sa dve kontrolne grupe: grupa od 10 pacijenata sa Parkinsonovom bolešću sa demencijom i 10 zdravih starih subjekata. Sve ispitivane grupe su testirane Mini mental skalom, Matisovom skalom za određivanje težine demencije i skalom za procenu ponašanja kod Alzheimerove bolesti, a koja je korišćena i kod ostalih ispitivanih grupa. Grupa sa demencijom sa Lewy-jevim telima je pokazala veće oštećenje u vizuelnim modalitetima pažnje, pamćenja i egzekutivnih sposobnosti u odnosu na bolesnike sa Alzheimerovom bolešću. Takođe, oboleli od demencije sa Lewy-jevim telima su pokazali veće oštećenje vizuoperceptivnih, vizuokonstruktivnih sposobnosti i veće prisustvo psihijatrijskih manifestacija u odnosu na obolele od Alzheimerove bolesti.

Ključne reči: Demencija sa Lewy-jevim telima, Alzheimerova bolest, Neuropsihologija.