

SAVREMENI PRISTUP TERAPIJI RAZLIČITIH FORMI LAJMSKE BOLESTI

Predrag Čanović¹, Olgica Gajović¹, Ljiljana Nešić¹, Željko Mijailović¹, Dragan Čanović²

¹Infektivna Klinika, KC Kragujevac

²Hirurška Klinika, KC Kragujevac

SAŽETAK

Lajmska bolest se razvija kroz stadijume pri čemu se razlikuje rana lokalizovana forma, čija je karakteristika Erythema migrans, rana diseminovana forma, u toku koje mogu biti zahvaćeni nervni sistem i srce, kao i pozna forma, u toku koje mogu biti zahvaćeni zglobovi, nervni sistem i koža. Lečenje ranih faza bolesti najčešće se sprovodi oralnom terapijom amoksicilinom ili doksiciklinom u trajanju od tri nedelje, mada postoje stavovi koji zagovaraju terapiju od četiri nedelje. Lečenje srčane afekcije i meningitisa najčešće se sprovodi ceftriaxonom ili cefotaksimom u trajanju od najmanje 14 dana. Pozne forme bolesti, posebno neurološke manifestacije, leče se višenedeljnom primenom ceftriaksona, odnosno cefotaksima, a izuzetno, kod osoba alergičnih na penicilin može se primeniti hloramfenikol. Za lečenje artritsa pored parenteralnog davanja cefalosporina može se primeniti i produžena terapija amoksicilinom ili doksiciklinom. Nakon uboda krpelja ne preporučuje se profilaktička primena antibiotika, već se prednost daje stručnom instrumentalnom odstranjenju parazita i praćenju ozledene osobe.

Ključne reči: Lajmska bolest, Borrelia, terapija