

AUTOIMUNOST I AUTOIMUNSKJE BOLESTI

22. ZAMOR I DEPRESIJA KOD BOLESNIKA SA MUTIPLOM SKLEROZOM

Miletić Drakulić S^{1,2}, Knezević Z, Tončev G^{1,2}.

¹Klinika za neurologiju, Klinički centar Kragujevac, Srbija

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

UVOD. Zamor i depresija su česti onesposobljavajući simptomi multiple skleroze (MS) koji nekada značajno utiču na kvalitet života ovih bolesnika. Cilj studije da odredi učestalost i definiše odnos zamora i depresije kod bolesnika sa MS.

MATERIJAL I METODE. Ispitano je 60 bolesnika sa dijagnozom definitivne MS: 76,6% bolesnika sa relapsno-remitentnom formom MS, 20% bolesnika sa sekundarno progresivnom MS i 3,4% bolesnika sa primarno progresivnom MS. Prosečno trajanje bolesti bilo je 8,1+5,5 godina, srednji stepen funkcionalne onesposobljenosti (EDSS) skor bio je 3,5+1,8 (opseg 1-8). Zamor je meren primenom skale težine zamora (FSS) dok je depresija merena primenom Beck-ove skale depresivnosti (BDI).

REZULTATI. Zamor je bio prisutan kod 92% bolesnika sa MS, prosečna vrednost FSS skora bila je 3,9+1,9 (rang 1-7), dok je prosečna vrednost BDI bila 10,8+10,1 (rang 0-39). Skor depresije je bio viši kod bolesnika sa zamorom i značajno je korelirao sa skorom težine zamora ($p < 0,05$).

ZAKLJUČAK. Zamor i depresija su značajni simptomi MS bolesnika. Značajna pozitivna korelacija zamora i depresije može ukazivati na moguće zajedničke mehanizme u nastanku ovih simptoma.

Ključne reči: multipla skleroza, zamor, depresija