

SLOBODNE TEME

37. TROMBOZA DUBOKIH VENA DONJIH EKSTREMITETA KAO ZNAK TUMORA U MALOJ KARLICI

Pejović T.

Zdravstveni centar Gornji Milanovac

CILJ RADA. Prikaz bolesnice kod koje je prvi znak ginekološkog tumora u maloj karlici bila manifestna tromboza dubokih vena (TDV) leve noge.

REZULTATI. Zbog otoka i bolova leve noge na Hirurško odeljenje Z.C. Gornji Milanovac primljena je bolesnica I.Z. stara 60 godina. Na osnovu anamneze i kliničkog nalaza postavljena je dijagnoza *Phlegmasia alba dolens*. Dijagnoza je potvrđena *Color Doppler* ultrazvučnim pregledom. Bolesnica je tretirana kontinuiranom infuzijom rastvora Heparina uz svakodnevnu kontrolu APTT-a. Terapijski efekat je dobijen već drugog dana terapije. Uz sistemsku heparinizaciju, uvedena je uporedo i peroralna antikoagulantna terapija. Bolesnica je mobilisana sedmog dana hospitalizacije uz elastičnu bandažu. Tada su se stvorili uslovi za dopunsku dijagnostiku. Načinjen je ultrazvučni pre-gled male karlice koji je otkrio postojanje džinovskog tumora poreklom od organa pelvisa, a CT abdomena pokazao je da tumor potiče od levih adneksa. Bolesnica je pripremljena i operisana u OE anesteziji. Evakuisan je tumor prečnika oko 50 cm, koji je ispunjavao celu trbušnu duplju. Tumor je bio multilokularne građe, histološki je postavljena dijagnoza *Adenocarcinoma ovarii*. U postoperativnom toku, otok i bol u desnoj nozi je nestao. Nakon šest meseci bolesnica je prevedena na antiagregacionu terapiju.

ZAKLJUČAK. Postojanje izolovane ili recidivantne TDV kod žena, zahteva kompletну eksploraciju organa male karlice.

Ključne reči: tromboza dubokih vena, tumor, mala karlica