

## SLOBODNE TEME

### 46. UČESTALOST I RASPROSTRANJENOST MALIGNIH NEOPLAZMI NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA

Radovanović S<sup>1,2</sup>, Milić Č<sup>1,2</sup>, Kocić S<sup>1,2</sup>, Gajević G<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut za javno zdravlje Kragujevac

<sup>2</sup>Medicinski fakultet Kragujevac

<sup>3</sup>Zdravstveni centar Aranđelovac

CILJ istraživanja je da se sagleda učestalost i rasprostranjenost malignih neoplazmi na teritoriji Šumadijskog okruga. Podaci su dobijeni iz Registra za rak, a na osnovu prijava malignih neoplazmi Službe epidemiologije Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac, za period 1996-2002. godina. Obrađene su prijave obolelih od malignih neoplazmi na teritoriji Šumadijskog okruga u definisanom periodu, ukupno 8027.

METOD. Analizirana je prevalencija i incidencija malignih neoplazmi za definisani period. Stope su prikazane na 100 000 stanovnika.

REZULTATI. Stope prevalencije malignih neoplazmi rastu u posmatranom periodu (1996-2002. godina) u svim opštinama Šumadijskog okruga. Najniža prosečna stopa prevalencije je u opštini Lapovo (1657), a najviša u opštini Knić (6317). Prosečna stopa incidencije za period 1996-2002. godina je najviša u opštini Knić (440), a najniža u opštini Aranđelovac (281). Prosečne stope incidencije po polu za period 1996-2002. godina, su po svim opštinama Šumadijskog okruga veće kod muškaraca, izuzev u Gradu Kragujevcu gde je veća kod žena.

ZAKLJUČAK. U ukupnom morbiditetu od malignih neoplazmi, na teritoriji opština Šumadijskog okruga, najučestalija lokalizacija po MKB su maligni tumori organa za varenje, zatim slede maligni tumori organa za disanje i organa grudne duplje.

**Ključne reči:** incidencija, prevalencija, maligna oboljenja, Šumadijski okrug