

ETIOPATOGENEZA I KLINIČKE KARAKTERISTIKE PSORIJAZE U PERIODU OD 2007. DO 2009. GODINE

Nebojša Krstić¹, Milena Stojiljković², Radojica Stolić³, Gordana Ristić¹, Ana Ravić-Nikolić¹, Vesna Miličić¹

¹ Centar za dermatovenerologiju, Klinički centar "Kragujevac"

² Institut za saobraćajnu medicinu, ŽTP "Beograd"

³ Klinika za nefrologiju, Klinički centar "Kragujevac"

SAŽETAK

Uvod: Psorijaza je hronična recidivirajuća psihosomatska dermatoza. Javlja se naglo u erupcijama. Za psorijazu je karakteristična klinička slika koju čine: eritem, papuloskvamozne promene i subjektivni simptom, svrab. Najverovatnije se lezije pojavljuju zbog ubrzane proliferacije epidermisa i abnormalne maturacije keratinocita.

Čilj: 1. Dokazati prisustvo faktora koji su od značaja za nastanak i tok bolesti, kao i pojavu komplikacija.

2. Utvrditi koje su glavne karakteristike psorijaze u analiziranom periodu.

Materijal i metode: Retrospektivnom studijom obuhvatili smo grupu od 50 pacijenata, starosti od 20 do 80 godina, koji su lečeni u "Centru za Dermato-venerologiju, KC Kragujevac", u periodu od 01.01.2007. do 01.01.2009. godine. Podatke smo dobili iz istorija bolesti. Prikaz podataka dat je u vidu procentualnih i apsolutnih vrednosti. Određena je aritmetička sredina i standardnu devijaciju za starosnu distribuciju. Od statističkih metoda korišćen je procentualni odnos i standardna devijacija. Rezultati su prikazani tabelarno i grafički.

Rezultati: Distribucija pacijenata: prema polu je bilo 35 (70,0%) pacijenata muškog pola i 15 (30,0%) ženskog pola; prema dermatološkom hereditetu: 12 (24,0%) hereditarno opterećenih i 38 (76,0%) hereditarno neopterećenih pacijenata; prema broju hospitalizacija: 21 pacijent (42,0%) je imao jednu hospitalizaciju, 8 pacijenata (16,0%) je imalo dve, 5 (10,0%) je imalo tri, 3 (6,0%) su imala četiri, 3 (6,0%) su imala pet i 10 (20,0%) je imalo deset i više hospitalizacija.

Zaključak: Prema našim rezultatima, najznačajniji faktor za nastanak psorijaze je psihički stres kod 35 (70,0%) ispitanika. Među našim pacijentima bilo je 17 (34,0%) pušača i 12 (28,0%) konzumenata alkohola. Nalazimo da su u obolelih od psorijaze najučestalije internističke kardiološke komplikacije (44,0%).

Ključne reči: psorijaza, etiopatogeneza, eritematozne ploče, srebrenastobebe skvame