

RAZLOZI ZA RAZVOJ KOMPLIKACIJA KOD KORISNIKA MEKIH KONTAKTNIH SOČIVA: KVALITATIVNA STUDIJA

Miloš N. Milosavljević¹, Jovana Z. Milosavljević², Aleksandar G. Kočović³, Milica N. Milentijević⁴,
Slobodan M. Janković¹, Srđan M. Stefanović³

¹Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Kragujevac

²Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za anatomiju, Kragujevac

³Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za farmaciju, Kragujevac

⁴Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

SAŽETAK

Cilj. Cilj rada bio je određivanje faktora rizika i njihove prave uloge u razvoju komplikacija kod korisnika mekih kontaktnih sočiva.

Metode. Studija je bazirana na principima jednog oblika kvalitativne analize podataka – konstruktivističke utemeljene teorije. Studijsku populaciju čine dve grupe ispitanika: 10 studenata korisnika mekih kontaktnih sočiva i četiri specijalizovana medicinska radnika iz oblasti oftalmologije. Urađen je intervju sa svakim ispitanikom ponaosob. Na osnovu audio-snimaka ovih intervjua napravljeni su odgovarajući transkripti razgovora, koji su nakon toga analizirani. Posle izbacivanja suvišnih reči iskristalisalo se 11 kategorija.

Rezultati. Preporuke oftalmologa možda imaju presudnu ulogu u formiranju stavova, koje korisnici mekih kontaktnih sočiva zauzimaju prema njihovoj adekvatnoj higijeni: higijena ruku, odgovarajuća čistoća posudica za čuvanje mekih kontaktnih sočiva i upotreba rastvora u predviđenom vremenskom roku imperativ su za korisnike mekih kontaktnih sočiva. Spavanje sa mekim kontaktnim sočivima duže i češće od preporuka oftalmologa jedan je od najvećih faktora rizika za razvoj simptoma suvog oka, dok plivanje sa mekim kontaktnim sočivima povećava rizik od pojave infekcije oka.

Zaključak. Glavni razlozi za pojavu komplikacija kod korisnika mekih kontaktnih sočiva jesu neadekvatna higijena i slabljenje komplijanse korisnika mekih kontaktnih sočiva tokom vremena.

Ključne reči: kontaktna sočiva, hidrofилna; sindromi suvog oka; infekcije oka; ulceracija rožnjače; kvalitativno istraživanje

presbyopia (2). The number of contact lenses users is increasing worldwide. The reason for such an expansion undoubtedly comes from their significant advantages over glasses in terms of larger field of view and better visual activity, as well as the fact that these optical aids enable