

BOHDALEKOVA HERNIJA KOD ODRASLOG PACIJENTA – PRIKAZ SLUČAJA*Ivana Meta Jevtović¹, Bojan Đokić¹, Romana Suša¹, Vojislav Čupurdija^{1,2}**¹Univerzitetski klinički centar Kragujevac Klinika za pulmologiju, Kragujevac**²Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra interne medicine, Kragujevac***SAŽETAK**

Cilj rada je da se prikaže redak slučaj Bohdalekove hernije kod odraslog pacijenta i da se naglase značaj kliničke sumnje i značajna uloga imidžing tehnika u postavljanju tačne dijagnoze ove abnormalnosti. Bohdalekova hernija predstavlja kongenitalni defekt lokalizovan na posterolateralnom zidu dijafragme, kroz koji organi trbušne duplje prolaze u grudni koš. Primarno se dijagnostikuje u neonatalnom i postneonatalnom periodu, dok je kod odraslih veoma retka. Autori prikazuju slučaj Bohdalekove hernije u odrasloj dobi sa simptomima koji potiču od gastrointestinalnog i respiratornog trakta. Dijagnoza je potvrđena kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša. Predstavljen je redak slučaj levostrane Bohdalekove hernije otkriven u kasnijoj životnoj dobi koja je hirurški tretirana sa uspehom.

Ključne reči: kile, dijafragmalne, kongenitalne; odrasla osoba; tomografija, X-zracima kompjuterizovana