

BOL U GRUDIMA I PREHOSPITALNO KAŠNJENJE

Marija Stevanović¹, Slavoljub R. Živanović¹
¹Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

SAŽETAK

Cilj. Cilj rada bio je da se za pacijente sa anginom pektoris (AP) i akutnim koronarnim sindromom (AKS) prikažu vreme trajanja bola u grudima pre javljanja u ambulantu hitne pomoći i način na koji su pacijenti pokušali sami sebi da pomognu.

Materijal i metode. Istraživanje je rađeno od avgusta 2014. do oktobra 2018. u ambulanti Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć (GZZHMP) u Beogradu. Istraživanje obuhvata 161 bolesnika od ukupno 9.437 pregledanih pacijenata jednog lekara kojima je postavljena dijagnoza AKS i AP ili se na nju posumnjalo.

Rezultati. Najveći procenat pacijenata sa AP čekao je između dva i 24 h, dok je kod bolesnika sa AKS to bilo < 1 h od početka tegoba do trenutka javljanja. Najveći broj bolesnika kako sa AKS (17), tako i sa AP (79) nije uzeo nikakvu terapiju, dok su pojedinci primenili jedan ili više lekova. Kod pacijenata sa AP u većini slučajeva (17,42%) primenjeni su lekovi za lečenje povišenog pritiska, a kod AKS najčešće Ntg i analgetici (31,03%). Kod svih pacijenata (AP i AKS) Ntg je ukupno primenjen u 12,42% slučajeva.

Zaključak. Pacijenti s postavljenom dijagnozom AP duže trpe tegobe u grudima od onih sa AKS, a najčešće kao samopomoć uzimaju lekove iz grupe antihipertenziva. Kao lek prvog izbora prema mnogim preporukama nitroglicerina se ređe koristi i pacijenti ga u većini slučajeva nemaju kod sebe.

Ključne reči: bol u grudima, primarna zdravstvena zaštita, samomedikacija.