

EFEKAT ANKSIOZNOSTI OD KOVIDA 19 NA SEKSUALNU FUNKCIJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA – ANKETA STUDIJE PRESEKA

Marjam Firouzabadi¹, Najmej Pouramezani², Fatimej Alavi-Arjas³, Mohadasej Balvardi⁴ i Neda Badrabadi¹

¹Škola medicinskih nauka Sirjan, Odsek za babice, Sirjan, Iran

²Škola medicinskih nauka Sirjan, Odsek za medicinske sestre, Sirjan, Iran

³Univerzitet medicinskih nauka Šahida Beheštija, Škola za medicinske sestre i babice, Teheran, Iran

⁴Škola medicinskih nauka Sirjan, Odsek za javno zdravlje, Sirjan, Iran

SAŽETAK

Cilj. Epidemija koronavirusa iz 2019. godine (COVID-19) bila je veliki izazov za pružaoce zdravstvenih usluga. Ova studija imala je za cilj da istraži vezu između anksioznosti zbog koronavirusa i seksualne funkcije zdravstvenih radnika.

Metode. U ovoj studiji je korišćena onlajn anketa da se istraži odnos između anksioznosti i seksualne funkcije kod zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19. Upitnik je uključivao Indeks ženskih seksualnih funkcija (FSFI) i Skalu anksioznosti korona bolesti (CDAS).

Rezultati. U ovu studiju bilo je uključeno ukupno 300 zdravstvenih radnika. Blage simptome anksioznosti prijavilo je 49%, umerene 29,2% i teške 29,9% ispitanika. Ukupan srednji skor FSFI zdravstvenih radnika bio je 19,1 ($SD = 4,4$). Rezultati su pokazali da je na ukupnoj skali 40,9% zdravstvenih radnika imalo blagu anksioznost. Rezultati su takođe pokazali da je seksualna funkcija žena u obrnutoj korelaciji sa anksioznosću tokom pandemije COVID-19. Takođe, pokazalo se da je anksioznost tokom COVID-19 u obrnutoj korelaciji sa seksualnim funkcionisanjem.

Zaključak. Ova studija je predstavila negativan uticaj pandemije COVID-19 na anksioznost i seksualnu funkciju zdravstvenih radnika. Stoga, psihološka ili seksualna pomoć može biti od koristi.

Ključne reči: seksualno ponašanje; anksioznost; zdravstveni radnici; COVID-19; ankete i upitnici.