

STRAH OD KOVIDA 19 MEĐU ZDRAVSTVENIM RADNICIMA – STUDIJA PRESEKA

Teodor Pevec

Opšta Bolnica Ptuj, Ptuj, Univerzitet u Mariboru, Medicinski fakultet, Maribor, Slovenija

SAŽETAK

Uvod. Pandemija uzrokovana kovidom 19 značajno je uticala na uslove rada zdravstvenih radnika. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi koji nivo straha od kovid 19 postoji kod bolničkog osoblja.

Metode. Ova studija je sprovedena na pogodnom uzorku medicinskih sestara i lekara iz četiri državne regionalne bolnice u Sloveniji. U ovoj studiji poprečnog preseka korišćena je Skala straha od kovid 19. Upitnik je popunilo 110 ispitanika.

Rezultati. Prosečni skor na skali bio je $16,3 \pm 6$. Kod više od polovine ispitanika istraživanja (61%) nivo straha je nizak, a kod 39% njih nivo straha je visok. Zaposleni s manje od 27 nedelja iskustva s kovidom 19 imaju višu srednju vrednost FCV-19s rezultata ($17,6 \pm 6,3$) od onih sa više od 27 nedelja kovid 19 iskustava ($14,7 \pm 5,4$), te je pronađena značajna razlika ($p = 0,006$). Statistički značajne razlike ponovno su pronađene i među zaposlenima s obzirom na kovid 19 jedinice (Jedinica intenzivne njege – JIN i akutna jedinica – AJ; stavka „strah od gubitka života“).

Zaključak. Bez obzira na trajanje epidemije, strah je i dalje prisutan. Iskustvo smanjuje strah među zaposlenima.

Ključne reči: kovid 19; strah; zdravstveno osoblje.