

ДИСЕМИНОВАНА ИНТРАВАСКУЛАРНА КОАГУЛАЦИЈА СА МАСИВНОМ ПЛУЋНОМ ТРОМБОЕМБОЛИЈОМ МУШКОГ НОВОРОЂЕНЧЕТА МАЈКЕ ПОЗИТИВНЕ НА SARS-COV-2

Александра М. Симовић^{1,2}, Тијана Продановић^{1,2}, Зорица Михајловић³, Драгана Савић^{1,2}, Сузана Живојиновић^{1,2},
Јелена Цековић Ђорђевић^{1,2}, Никола Продановић^{4,5}, Анђелка Стојковић^{1,2}

¹Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за педијатрију, Крагујевац

²Универзитетски клинички центар Крагујевац, Педијатријска клиника, Крагујевац

³Универзитетски клинички центар Крагујевац, Одељење за патолошку анатомску дијагностику, Крагујевац

⁴Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за хирургију, Крагујевац

⁵Универзитетски клинички центар Крагујевац, Клиника за ортопедију и трауматологију, Крагујевац

САЖЕТАК

Имуне и физиолошке промене које се јављају током трудноће могу повећати ризик од развоја озбиљних SARS-CoV-2 инфекција. У раду је приказан случај неинфицираног новорођенчета, чија је вредност Апгар скова у петом минуту била осам и које је развило масивну плућну тромбоемболију у првих 36 сати од рођења од мајке позитивне на SARS-CoV-2 без икаквих симптома. Пажљиво праћење новорођенчета и одређивање коагулационог статуса и маркера запаљења на дневном нивоу може бити оправдано у SARS-CoV-2 позитивној трудноћи.

Кључне речи: SARS-CoV-2; одојче, новорођенче; тромбоемболизам